

8

TEMAT NUMERU

Rola cholin w suplementacji
ciężarnych

lek. Natalia Jainta,
prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta,
prof. dr hab. n. med. Agnieszka Droszol-Cop

TO WIEDZIEĆ POWINNIŚMY

- 12 Niesteroidowe leki przeciwzapalne w ginekologii. Jak je stosować skutecznie i bezpiecznie
dr n. med. Jarosław Woroń
Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) są jednymi z najczęściej stosowanych leków w farmakoterapii bólu. Ich zastosowanie w ginekologii jest najczęściej związane z łagodzeniem bólu pozabiegowego i pooperacyjnego, stosuje się je jako leki z wyboru w zespole bolesnego miesiączkowania, a także w bólu, który może towarzyszyć stanom zapalnym zlokalizowanym w miednicy mniejszej. Wybór NLPZ powinien uwzględniać istotne elementy ich skuteczności i bezpieczeństwa.
- 20 Nowe spojrzenie na doustną złożoną antykoncepcję w schemacie wydłużonym
**dr n. med. Anna Fuchs,
prof. dr hab. n. med. Agnieszka Droszol-Cop,
prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta**
Jedną z najczęściej stosowanych metod uniknięcia ciąży jest doustna antykoncepcja hormonalna. Na szczególną uwagę zasługuje doustna złożona antykoncepcja o schemacie wydłużonym, ponieważ umożliwia ona kobietom zmniejszenie liczby menstruacji w ciągu roku do zaledwie czterech. Jest to idealna metoda dla młodych, wysportowanych kobiet, dzięki której miesiączka nie ogranicza ich codziennej aktywności.
- 28 Zastosowanie preparatów niepokalanka mnisiego w ginekologii I położnictwie
**prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta,
dr n. med. Anna Fuchs,
prof. dr hab. n. med. Agnieszka Droszol-Cop,
lek. Bartosz Marcinkiewicz, lek. Natalia Jainta, lek. Mateusz Szul**
W badanym piśmiennictwie wykazano skuteczność i bezpieczeństwo VAC w terapii cyklicznej mastalgii. Wykazano również, że VAC zapobiega częstym przypadkom podwyższenia parametrów wątrobowych w okresie pomenopauzalnym, a także sugerowano możliwość łagodzenia objawów menopauzy. Nie wykazano natomiast skuteczności VAC w pobudzaniu laktacji, regulowaniu poziomu libido ani wpływu na płodność.
- 33 Nietrzymanie moczu. Rozważania ginekologa pierwszego kontaktu
dr n. med. Anna Paczkowska
Zaburzenia anatomii i funkcji dna miednicy dotyczą połowy populacji dorosłych kobiet. Zagadnienie to jest ważne i bardzo niejednoznaczne. Artykuł prezentuje przemyślenia i opisuje trudności diagnostyczne i terapeutyczne, jakie napotkał w swej pracy lekarz klinicysta zajmujący się od wielu lat diagnostyką i leczeniem – zarówno zachowawczym, jak i operacyjnym – zaburzeń statyki narządów płciowych i nietrzymania moczu.
- 41 Kobieta w gabinecie ginekologicznym
**Marta Schmidt, Aleksandra Krupa,
Julia Parka, Katarzyna Zborowska, Daria Jorg,
prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta**
- 48 Liszaj twardzinowy
dr n. med. Karolina Waleśkiewicz-Ogórek
- 51 Problemy związane z przedwczesną inicjacją seksualną w kontekście promocji zdrowia w profilaktyce ginekologicznej. Aspekty ginekologiczne znaczenia poczucia odpowiedzialności w relacjach seksualnych
dr hab. n. o zdr. Grażyna Jarząbek-Bielecka
- 58 Konflikt serologiczny – przyczyny, diagnostyka i leczenie
**Katarzyna Nowak, Mateusz Szul,
lek. Iwona Czech, dr n. med. Anna Fuchs,
prof. dr hab. n. med. Agnieszka Droszol-Cop**
Choroba hemolityczna noworodków nadal pozostaje wyzwaniem w praktyce położniczej. Może ona skutkować nawet zgonem noworodków, stąd niezwykle ważna jest diagnostyka i profilaktyka konfliktu serologicznego. Szczególną uwagę należy zwrócić na monitorowanie ciężarnych Rh-ujemnych, których płód jest Rh-dodatni. Nie można jednak zapomnieć o niezgodności w innych układach grup krwi. W pracy omówiono przyczyny, objawy, powikłania, diagnostykę oraz leczenie.
- 63 Diagnostyka niepłodności i inseminacja
**Paulina Sieradzka, Joanna Pilarska,
Aleksandra Matonóg, dr n. med. Anna Fuchs,
prof. dr hab. n. med. Agnieszka Droszol-Cop**
Rozpoznanie niepłodności umożliwia dobranie odpowiedniej metody postępowania leczniczego. Szczególnie ciekawe wydaje się przeprowadzenie inseminacji domacicznej, uznawanej za zabieg mniej inwazyjny od zapłodnień pozaustrojowych. Stanowi on rozwiązanie m.in. w przypadku występowania nieprawidłowości nasienia, w zaburzeniach ejakulacji czy przy endometriozie.